



ASL Foggia

PugliaSalute

**Direttore Generale**

Tel. 0881.884609

Mail: [dirgen.segreteria@aslfg.it](mailto:dirgen.segreteria@aslfg.it)

PEC: [aslfg@mailcert.aslfg.it](mailto:aslfg@mailcert.aslfg.it)

**Alla Dott.ssa Elvira Sparacia**

Referente Scuola Covid 19 ASL FG

mail: [elvira.sparacia@aslfg.it](mailto:elvira.sparacia@aslfg.it)

**Oggetto:** Piano di vaccinazione anti-covid 19 per gruppi target - operatori scolastici.

In ossequio alla nota del Dipartimento Salute della Regione Puglia del 3.3.2021, prot. 0001770 (*Allegato 1*), ad oggetto "Piano Strategico Nazionale Vaccinazione anti-SARS-Cov-2/COVID-19 - INDICAZIONI OPERATIVE", si prega fornire con cortese sollecitudine la raccolta degli elenchi degli operatori scolastici over 65 e di quelli che si trovano in condizioni di estrema vulnerabilità che, come indicato nella Tabella 2 del documento del Ministero della Salute denominato "Vaccinazione anti SARS-CoV2/COVID-19. Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione (*Allegato 2*), individuati e comunicati dai medici competenti di ciascun istituto Scolastico ovvero in mancanza di tale figura dal proprio medico di fiducia.

Si precisa che la raccolta dei dati va effettuata con le modalità consentite dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e sensibili e, quindi, con il coinvolgimento del medico competente, ove nominato.

Distinti saluti

Giovanni Iannucci  
Direttore SISP

Vito Piazzolla  
Direttore Generale

Antonio Giuseppe Nigri  
Direttore Sanitario



Tabella 2

Aree di patologia	Definizione
Malattie Respiratorie	Fibrosi polmonare idiopatica; altre patologie che necessitano di ossigenoterapia
Malattie cardiocircolatorie	Scompenso cardiaco in classe avanzata (IV NYHA); pazienti post shock cardiogeno.
Condizioni neurologiche e disabilità (fisica, sensoriale, intellettiva, psichica)	Sclerosi laterale amiotrofica; sclerosi multipla; paralisi cerebrali infantili; pazienti in trattamento con farmaci biologici o terapie immunodepressive e convidenti; miastenia gravis; patologie neurologiche disimmuni.
Diabete/altre endocrinopatie severe (quali mordo di Addison)	Soggetti over 18 con diabete giovanile, diabete di tipo 2 e necessitano di almeno 2 farmaci ipoglicemizzanti orali o che hanno sviluppato una vasculopatia periferica con indice di Fontaine maggiore o uguale a 3
Fibrosi cistica	Pazienti da considerare per definizione ad alta fragilità per le implicazioni respiratorie tipiche della patologia di base.
Insufficienza renale/patologia renale	Pazienti sottoposti a dialisi.
Malattie autoimmuni - immunodeficienze primitive	Grave compromissione polmonare o marcata immunodeficienza e convidenti; immunodepressione secondaria a trattamento terapeutico e convidenti.
Malattia epatica	Pazienti con diagnosi di cirrosi epatica.
Malattie cerebrovascolari	Evento ischemico-emorragico cerebrale che abbia compromesso l'autonomia neurologica e cognitiva del paziente affetto. Persone che hanno subito uno "stroke" nel 2020 e per gli anni precedenti con rankin maggiore o uguale a 3.
Patologia oncologica e emoglobinopatie	Pazienti onco-ematologici in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure e convidenti. Genitori di pazienti sotto i 16 anni di età. Pazienti affetti da talassemia.
Sindrome di Down	Tutti i pazienti con sindrome di Down in ragione della loro parziale competenza immunologica e della assai frequente presenza di cardiopatie congenite sono da ritenersi fragili.
Trapianto di organo solido: in lista di attesa e sottoposti a trapianto emopoietico dopo 3 mesi dal trapianto ed entro 1 anno dalla procedura	Trapianto di organo solido o emopoietico al di fuori delle tempistiche specificate, che abbiano sviluppato una malattia del trapianto contro l'ospite cronica in terapia immunosoppressiva e convidenti.
Grave obesità	Pazienti con BMI maggiore di 35